



Gelsectan®

Prikkelbare Darm | Côlon Irritable | Reizdarm

(NL)

Gebruiksaanwijzing

Indicaties

Gelsectan® is bedoeld om de darmfunctie te herstellen bij mensen die last hebben van symptomen als gevolg van het prikkelbare darm syndroom (PDS), intestinale overgevoeligheid of na het innemen van sommige geneesmiddelen om symptomen, zoals diarree, gespannen buik, pijn, opgeblazen gevoel en winderigheid te verlichten of te voorkomen.

Presentaties

Blisterverpakking met dertig en zestig capsules voor gebruik door volwassenen.

Samenstelling

Xyloglucan, erwtenewit en extract van druivenpitten, xylo-oligosacchariden, magnesiumstearaat (van plantaardige oorsprong) en amorf geprecipiteerde silica.

Aanwijzingen voor gebruik

De capsules innemen met vloeistof.

Dosering

1 of 2 capsules, afhankelijk van de symptomen, tweemaal per dag ('s morgens en 's avonds voor het eten) gedurende 2 tot 4 weken. De behandeling kan, indien nodig, worden voortgezet.

Opelet

- Raadpleeg een arts die het prikkelbare darm syndroom (PDS) bij u kan vaststellen.
- Raadpleeg een arts bij ernstige of aanhoudende symptomen of bij twijfels over de diagnose, vooral bij ouderen.
- Dit medisch hulpmiddel is geen farmacologische behandeling. Indien een dergelijke behandeling is aanbevolen door een professionele zorgverlener, kan het hulpmiddel gelijktijdig worden gebruikt. Overleg dit altijd met uw arts.
- Er zijn geen bijwerkingen bekend, mits het product gebruikt wordt volgens de gebruiksaanwijzing. Wij adviseren om het product niet te gebruiken tijdens de zwangerschap of de eerste maanden van de borstvoeding, tenzij anders aangegeven door een professionele zorgverlener.
- Niet gebruiken na de vervaldatum vermeld op de verpakking.
- Het product niet gebruiken als de blister geopend of beschadigd is.
- Niet bewaren boven 25°C. Niet invriezen.
- Het product buiten het bereik van kinderen houden.

Contra-indicaties

Gelsectan® mag niet worden gebruikt bij mensen met een bekende overgevoeligheid voor xyloglucan of enig ander ingrediënt uit de lijst vermeld in de rubriek "Samenstelling".

Medisch hulpmiddel

(FR)

Instructions d'utilisation

Indications

Gelsectan® est conçu pour restaurer la fonction intestinale chez les personnes présentant des symptômes dus au syndrome du côlon irritable (SCI), à une hypersensibilité intestinale ou à la prise de certains médicaments pour soulager et prévenir des symptômes tels que la diarrhée, la tension abdominale, la douleur, les ballonnements et les flatulences.

Présentations

Plaquette thermoformée contenant trente et soixante gélules pour une utilisation chez l'adulte.

Composition

Xyloglucan, protéine du pois et extrait de pépin de raisin, xylo-oligosaccharides, stéarate de magnésium (origine végétale) et silice précipitée amorphe.

Mode d'emploi

Avaler les gélules avec des liquides.

Posologie

1 ou 2 gélules en fonction des symptômes, deux fois par jour (le matin avant le petit-déjeuner et le soir avant le dîner) pendant 2 à 4 semaines. Le traitement peut être maintenu au besoin.

Avertissements

- Consultez un médecin qui peut établir que vous avez un syndrome du côlon irritable (SCI).
- Consultez un médecin en cas de symptômes sévères ou persistants, ou lorsqu'il existe des doutes quant au diagnostic, en particulier chez les personnes âgées.
- Ce dispositif médical n'est pas un traitement pharmacologique. Si un professionnel de la santé recommande un tel traitement, le dispositif peut être administré simultanément. Consultez toujours votre médecin.
- Aucun effet indésirable connu n'est associé au produit lorsque celui-ci est utilisé conformément aux instructions d'utilisation mode d'emploi. Il est recommandé de ne pas utiliser ce produit pendant la grossesse ou les premiers mois de l'allaitement, sauf si d'autres conseils ont été donnés par un professionnel de la santé.
- Ne pas utiliser ce produit après la date de péremption imprimée sur l'emballage.
- Ne pas utiliser le produit si la plaquette est ouverte ou endommagée.
- À conserver à une température ne dépassant pas 25°C. Ne pas congeler.
- Tenir le produit hors de la portée des enfants.



Gelsectan®

Prikkelbare Darm | Côlon Irritable | Reizdarm

Contre-indications

Gelsectan® ne doit pas être utilisé chez des patients présentant une hypersensibilité connue au xyloglucan ou à l'un des autres composants du produit (voir Composition).

Dispositif médical



Gebrauchsanweisung

Behandlungsanzeige

Gelsectan® ist für die Anwendung zur Wiederherstellung der Darmfunktion bei Personen mit Symptomen aufgrund von Reizdarmsyndrom (RDS), Überempfindlichkeit des Darms oder nach der Einnahme bestimmter Medikamente bestimmt, um Symptome wie Durchfall, abdominales Spannungsgefühl, Schmerzen, Blähbauch und Flatulenz zu lindern und zu vermeiden.

Packungsgrößen

Blisterpackung mit dreißig und sechzig Kapseln zur Anwendung bei Erwachsenen.

Zusammensetzung

Xyloglucan, Erbsenprotein und Traubenerkerextrakt, Xylooligosaccharide, Magnesiumstearat (pflanzlich) und amorphes gefalltes Siliciumdioxid.

Hinweise zur Anwendung

Kapsel mit Flüssigkeit schlucken.

Dosierung

Abhängig von den Symptomen 1 oder 2 Kapseln zweimal täglich (morgens vor dem Frühstück und abends vor dem Abendessen) über einen Zeitraum von 2 bis 4 Wochen. Die Behandlung kann falls nötig aufrechterhalten werden.

Warnhinweise

- Die Diagnose Reizdarmsyndrom (RDS) kann ausschließlich von Ihrem Arzt gestellt werden.
- Wenden Sie sich bei schweren oder anhaltenden Symptomen oder bei Unsicherheiten bezüglich der Diagnose an einen Arzt, insbesondere bei älteren Menschen.
- Bei diesem Medizinprodukt handelt es sich nicht um eine pharmakologische Behandlung. Falls eine solche Behandlung von einem Arzt empfohlen wird, kann das Medizinprodukt begleitend verabreicht werden. Besprechen Sie dies in jedem Fall mit Ihrem Arzt.
- Falls das Produkt laut Gebrauchsanweisung verwendet wird, sind Nebenwirkungen nicht bekannt. Wir empfehlen, falls nicht anders vom Arzt verordnet, das Produkt nicht während der Schwangerschaft oder in den ersten Monaten der Stillzeit anzuwenden.
- Produkt nicht nach Ablauf des Verfalldatums anwenden, das auf der Packung abgedruckt ist.

- Produkt nicht anwenden, wenn die Blisterpackung geöffnet oder beschädigt ist.
- Nicht über 25 °C lagern. Nicht einfrieren.
- Produkt für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Gegenanzeigen

Gelsectan® soll nicht bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Xyloglucan oder einen der im Abschnitt „Zusammensetzung“ genannten sonstigen Bestandteile des Produkts angewendet werden.

Medizinprodukt



DEVINTEC SAGL Via Berna, 9
6900 Lugano - Zwitserland/La Suisse/Schweiz

BE: Verdeler/Distributeur/Vertrieb
Truvion Healthcare N.V. | Walgoedstraat 12A
9140 Temse | België/Belgique/Belgien
www.gelsectan.be

NL: Distributeur
Truvion Healthcare B.V. | Postbus 145, 1380 AC
Weesp | Pampuslaan 186, 1382 JS Weesp
Nederland
www.gelsectan.nl

Rev. 01c 0224 : 20.01.2020